

## **Info: Impfplan für Erwachsene**

Der „Impfplan Österreich“ in der jeweils gültigen Fassung wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz herausgegeben und fasst den Konsens der Expertinnen und Experten des nationalen Impfgremiums zusammen. Er umfasst etwa 150 Seiten und kann im Internet eingesehen werden.

Die folgenden Angaben sind dem Impfplan Österreich entnommen. Sie gelten für Erwachsene. Zu einzelnen Erkrankungen und Impfungen siehe auch die entsprechenden Kapitel unter [impfen1220.at](http://impfen1220.at).

### **Allgemein empfohlene Impfungen**

#### **Vierfachimpfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung:**

Bei vorhandener Grundimmunisierung: Auffrischungsimpfung alle 10 Jahre bis zum 60. Lebensjahr, danach alle 5 Jahre.

Bei fehlender Grundimmunisierung insgesamt 3 Dosen: 1. Dosis, danach eine 2. Dosis nach 1-2 Monaten, danach eine 3. Dosis nach 6-12 Monaten.

#### **Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps, Röteln (Lebendimpfstoff):**

Bei fehlender Grundimmunisierung: 2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen (keine Auffrischung nötig)

#### **Varicellen/Windpocken (Lebendimpfstoff):**

Bei fehlender Grundimmunisierung: 2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen (keine Auffrischung nötig)

### **HPV/Humanes Papilloma Virus/Gebärmutterhalskrebs:**

Bei fehlender Grundimmunisierung insgesamt 3 Dosen: 1. Dosis, danach eine 2. Dosis nach 2 Monaten, danach eine 3. Dosis nach 6 Monaten. Keine weitere Auffrischungsimpfung.

### **FSME/Frühsummermeningoencephalitis/Zecken:**

Bei fehlender Grundimmunisierung: Drei Dosen innerhalb von ungefähr einem Jahr (im Detail unterschiedliches Schema je nach Impfstoff). Ein Schnellimmunisierungsschema (ungefähr ein Monat) ist möglich, allerdings ist danach bereits nach einem Jahr eine Auffrischung notwendig.

Auffrischung: Erste Auffrischung (bei konventioneller Grundimmunisierung) nach 3 Jahren, danach bei unter 60 jährigen alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre.

### **Pneumokokken/„Lungenentzündung“:**

Bei Menschen mit einem besonderen Risiko gelten andere Empfehlungen.

Bei Erwachsenen mit durchschnittlichem Risiko:

Ab dem vollendeten 50. Lebensjahr einmalig mit dem Impfstoff PNC13 und nach einem Jahr einmalig mit dem Impfstoff PPV23.

Spezielle Impfschemata für Risikopersonen.

### **Influenza/Grippe:**

Jährliche Impfung für alle Personen.

Spezielle Impfschemata für Risikopersonen.

### **Herpes zoster/Gürtelrose:**

Ab dem vollendeten 50. Lebensjahr:

2 Dosen im Abstand von mindestens 2 Monaten