

Info: Impfplan ab der 7. Lebenswoche bis zum vollendeten 6. Lebensjahr

Der „Impfplan Österreich“ in der jeweils gültigen Fassung wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz herausgegeben und fasst den Konsens der Expertinnen und Experten des nationalen Impfgremiums zusammen. Er umfasst etwa 150 Seiten und kann im Internet eingesehen werden.

Die folgenden Angaben sind dem Impfplan Österreich entnommen. Zu einzelnen Erkrankungen und Impfungen siehe auch die entsprechenden Kapitel unter impfen1220.at.

Allgemein empfohlene Impfungen

Schluckimpfung gegen Rotavirus

Die Schluckimpfung schützt zu über 70% vor Rotavirus-Durchfallerkrankungen und zu über 90% vor schwerem Rotavirus-Brechdurchfall.

Sie ist im Gratisimpfprogramm enthalten.

Frühestmöglich ab der 6. Lebenswoche sollen 2 (bei Verwendung von Rotarix®) bzw. 3 (bei Verwendung von Rotateq®) Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen verabreicht werden.

Die Impfserie muss bis zum Alter von 24 Wochen (Rotarix®) bzw. 32 Wochen (Rotateq®) abgeschlossen sein.

Sechsfachimpfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung: Haemophilus influenzae B und Hepatitis B:

Die Impfung ist im Gratisimpfprogramm enthalten. (Hexyon®, Infanrix hexa®)

Sie soll im 3., 5. und 12. (bis 14.) Lebensmonat verabreicht werden.

Nachholimpfungen sind bis zum 24. Lebensmonat sinnvoll und kostenfrei.

Eine Auffrischung gegen Diphtherie, Tetanus, Polio und Pertussis (Repevax®, Boostrix polio®) ist dann ab dem 7. Lebensjahr vorgesehen.

Pneumokokken/„Lungenentzündung“:

Die Impfung ist für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr im kostenfreien Impfprogramm enthalten. (Synflorix[®], 10-valent)

Es wird im **3., 5. und 12. (bis 14.) Lebensmonat** geimpft.

Kindern mit Risiken steht die Impfung bis zum 5. Lebensjahr gratis zur Verfügung.

Außer dem im Gratisimpfprogramm vorhandenen 10 valenten Impfstoff Synflorix[®] steht noch ein 13 valenter Impfstoff Prevenar13[®] zur Verfügung.

Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps, Röteln (Lebendimpfstoff):

Für alle Altersgruppen im Gratisimpfprogramm enthalten.

Lebendimpfstoff. **2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen so früh wie möglich ab dem vollendetem 9. Lebensmonat.**

In Ausbruchssituationen kann bereits ab dem 6. Lebensmonat geimpft werden.

Meningokokken B

Die Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten, aber möglichst früh **ab dem 2. Lebensmonat** empfohlen. (Bexsero[®])

Es sind bei Impfbeginn bis zum 2. Lebensjahr insgesamt 3 Dosen. Beim Impfbeginn ab dem 2. Lebensjahr insgesamt 2 Dosen empfohlen.

Meningokokken C

Nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten. Eine einmalige Impfung ab dem 1. Lebensjahr ist empfohlen. (Neisvac C[®], Menjugate[®])

FSME/Frühsummermeningoencephalitis/Zecken:

Nicht im kostenfreien Kinderimpfprogramm enthalten, aber **ab dem vollendeten 1. Lebensjahr empfohlen.**

Drei Dosen innerhalb von ungefähr einem Jahr (im Detail unterschiedliches Schema je nach Impfstoff. FSME-Immun[®], Encepur[®]).

Auffrischung: Erste Auffrischung (bei konventioneller Grundimmunisierung) nach 3 Jahren, danach alle 5 Jahre.

Varicellen/Windpocken (Lebendimpfstoff):

Die Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten.

Empfohlen sind **2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen** (keine Auffrischung nötig) möglichst früh **ab dem vollendeten 1. Lebensjahr**.

Hepatitis A:

Die Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten.

Die Impfung ist möglichst früh ab dem vollendeten ersten Lebensjahr empfohlen. 2 Dosen im Abstand von mindestens 6 Monaten.

(Kombination mit Hepatitis B möglich, anderes Impfschema)

Influenza/Grippe:

Die Impfung ist nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten.

Jährliche Impfung für alle Personen ab dem vollendeten 6. Lebensmonat empfohlen.

Bei erstmaliger Impfung sollen 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen gegeben werden. Danach jährlich eine Impfung.